

2012年口腔助理医师外科学辅导：舌筋短最好两岁前手术

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_656528.htm

舌系带发育异常，俗称“舌筋”短，最好两岁前做手术，因为这个年龄的孩子还没有形成不良的发音模式。舌系带发育异常，俗称“舌筋”短，最好两岁前做手术。因为这个年龄的孩子还没有形成不良的发音模式。年龄稍大一些后再做效果稍差一些，需要配合语音训练。正常舌系带可以使舌头活动自如，舌尖能自然地伸出口外，伸出时舌尖呈V字形，而舌系带过短儿童的舌头不能正常自由地前伸，伸出时舌尖呈W形；另外，正常舌系带可以使舌头在张口时上舔到上腭，而舌系带过短的儿童在张口时舌尖不能上翘，不能舔到上齿龈或伸过上唇。孩子舌系带过短应尽早到正规口腔医院接受手术治疗，在局部麻醉下将过短的舌系带切断，这样就可以使孩子的舌系带延长了。两岁前为最佳手术时间，因为此时孩子的舌系带较薄，术后出血少，伤口很快就可以愈合。对于一般的舌系带发育异常，只是单纯的舌系带短，满月就可以做手术，手术简单，用止血钳把舌尖牵拉，把系带剪断。剪到能伸出舌头、抬起舌头为止。局部用麻药，不会产生副作用，几分钟之内结束。手术效果好，术后出血少的婴儿甚至不用缝线。对于那些舌系带发育异常比较严重的，舌系带厚、短、宽的孩子，最好在两岁之前做手术，手术在半小时左右，而费用也不高。对于年龄比较大的儿童，也可以做手术，但是由于已经习惯于以前的发音方式，做完手术之后，需要进行语音训练。这些孩子的卷舌音发音不够准确，比如儿、肉、六等。语音训练需要

家长配合，教孩子正确的发音方式，从简单的汉语拼音练起。特别提醒家长，若发现孩子舌系带发育异常应尽早做手术，做到早期发现早期治疗效果最佳。据介绍，做此类手术年龄最小的只有一个月，最大的十几岁，经过语音训练后效果都不错。小编推荐：[#0000ff>2012年口腔助理医师外科学辅导：拔牙的愈合过程](#) [#0000ff>2012年口腔外科：半岁左右宜做舌系带矫正术](#) [#0000ff>2012年口腔助理医师外科学辅导：牙垢和牙石的区分](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com